臺灣的候鳥

/ 池文傑

臺灣的候鳥

臺灣本島處於太平洋西岸花彩列嶼的中央位置，正好位在東亞候鳥遷徙路徑上，加上具有多樣化適宜棲地提供不同候鳥賴以生息，遂成爲成千上萬的候鳥南遷北返時之中間驛站或目的地。臺灣的候鳥不僅種類繁多而且數量豐富，一年四季都有不同的候鳥們前來造訪，這也造就了臺灣珍貴的鳥類資源，臺灣超過半數以上的可見鳥類都是這些長途跋涉的旅者喔！芳蹤簇現的候鳥種類十分多樣，除了鷺、雁鴨、鷸鴴、鷗、猛禽以外，還包括許多鶯、鶺鴒、鶇、鴴、杜鵑、伯勞、燕、鴴、鶲、雀、椋鳥.....等等。

臺灣候鳥的季節變化

不同候鳥之遷徙抵達時間和停駐離去時間有所差異，造成不同地點、不同時序的候鳥組成產生變化。臺灣的候鳥鳥種組成之季節變化大致可以分成六個依序循環之時期，若自候鳥度冬期開始，依序爲(1)候鳥度冬期，(2)春季過境前期，(3) 春季過境期，(4) 夏候鳥期，(5)秋季過境期，(6)秋季過境後期。各時期的候鳥概況分別簡述如下：

(1)候鳥度冬期：時間大致爲 11 月至隔年2月，這時以在臺灣度冬之水鳥較爲常見，如濱鷸、東方環頸鴴、金斑鴴、灰斑鴴、大白鷺、蒼鷺、青足鷸、小水鴨等都具有相當的數量，只要前往沿海濕地一探究竟，大多可一窺這些候鳥們的可愛面貌。而許多鴴、鶇、鶯、鷸、鴴則於 11 月上旬仍陸續過境抵達，有些物種也將在臺灣度冬，如黑臉鴴、黃尾鴴、白腹鶇等；除此之外，每年於台南七股潟湖地區度冬的黑面琵鷺，亦是相當值得觀察的國際保育物種。

(2)春季過境前期：時間爲3月，這時期

許多度冬候鳥開始北返離開臺灣，踏上返回繁殖地的歸途；而春季過境先鋒部隊的身影亦在此時出現，如鷹斑鷸、小環頸鴴、小辮鴴等；部分鴴、鷺、鷗也開始北返過境，如野鴴、短翅樹鷚等；此外，家燕也於此時大量抵達。

(3)春季過境期：時間爲4月，這時是大部分候鳥的主要北返時期，除了北返的先鋒部隊外，灰面鷲、蒙古鴴、鐵嘴鴴、尖尾鷸、穉鷸、小青足鷸、澖鷸、黃足鷸、翻石鷸、反嘴鷸、黑腹燕鷗、黃鶺鴒、黑臉鷗等多在此時期北返過境；在臺灣度冬之候鳥在此時大多皆已離開北返，而許多夏候鳥也前來報到，如鷹鵑、筒鳥、黃頭鷺、燕鴴等。

(4)夏候鳥期：時間大致是5月至8月；5月時少數鳥種仍持續過境臺灣，例如黃足鷸、翻石鷸等；5月底所有冬候鳥與過境鳥均已北返，而夏候鳥的黃頭鷺、小燕鷗與鳳頭燕鷗此時亦已到來；8月時過境與度冬水鳥的先頭部隊已翩然來到，如東方環頸鴴、鐵嘴鴴、金斑鴴、高蹺鴴、鷹斑鷸、青足鷸、黃足鷸等。

(5)秋季過境期：時間爲9月，這時是許多度冬或過境鷸鴴的主要南遷時期，除了先頭部隊外，還有小環頸鴴、蒙古鴴、濱鷸、雲雀鷸、中杓鷸、尖尾鷸、穉鷸、小青足鷸、澖鷸等；夏候鳥於此時大多往南遷徙離去，而這時亦是紅尾伯勞的過境高峰期。

(6)秋季過境後期：時間爲 10 月，這時是許多猛禽、鷺、鶺鴒、燕、鶇、鴴、鷗、鶲、雀的過境時期，灰面鷲、極北柳鶯、黃鶺鴒、赤喉鷚、家燕、黃尾鴴、藍磯鶇、藍尾鴴常常暫時停駐過境臺灣；此外許多不常見或難得見到的候鳥也多在此時顯露芳蹤，如花雀、灰斑鶲、灰椋鳥等。

臺灣常見的候鳥

黃頭鷺 （攝影者：黃文欣）

終年可見，但主要是3至9月的普遍夏候鳥。牠們的喙較其他白鷺粗短且終年都是黃色，腳爲黑褐色，非繁殖期時羽色幾乎全身雪白；繁殖期時，在頭部、頸部和背部出現顯眼之褐黃色。喜於平地草地、農耕地及垃圾場聚集出現，常尾隨於牛群及農耕機四周或停棲於牛背上。

蒼鷺 （攝影者：陳毅翰）

主要是 10 月至翌年 4 月普遍之冬候鳥。爲大型的灰色鷺鷥，嘴黃色，眼上至頭後有明顯的黑色飾羽，頸前有不連續之黑色縱紋；飛行時，寬大的黑色翼緣與灰色身軀形成強烈對比。常成群出現於潮間帶灘地、河口濕地、近海之沼澤或魚塭。爲臺灣可見鷺科鳥類中體型最大者。

黑面琵鷺 （攝影者：賴鵬智）

10 月下旬至翌年 4 月之冬候鳥。全身幾乎雪白，具有黑色而先端寬扁如湯匙狀之喙，喙基部至眼周圍爲黑色；繁殖期時，上胸黃褐色，頭後則有明顯黃色飾羽，眼前常出現黃斑。主要出現於潮間帶、河口、草澤及鹽田。於臺南曾文溪口擁有全世界最大之度冬族群，是極待保護之物種。

小水鴨 （攝影者：陳毅翰）

10 月至翌年 3 月普遍之冬候鳥。雌鳥全身大致爲單調之暗褐色；雄鳥非繁殖期時的羽色與雌鳥相近，繁殖期時頭部轉爲栗紅色且有明顯的綠色眼帶，身體變成石板灰色且密佈細密鱗紋，臀側有顯眼的三角形乳黃色大斑。通常成群聚集於沼澤、河口、湖泊或內陸大型水域，亦會棲息於水田；是度冬雁鴨群的主要成員。

琵嘴鴨 （攝影者：黃文欣）

10 月至翌年 4 月普遍之冬候鳥。中大型的雁鴨，有著一雙紅色腳丫，具有大而前緣下彎的匙狀喙；雌鳥喙爲黃色，雄鳥喙則爲黑色；雄鳥繁殖期時，頭頸轉爲墨綠色，體上、胸及腰側與體側爲黑褐色、白色與栗紅色的強烈對比。常出現於河口、沼澤與湖泊地帶。

花嘴鴨 （攝影者：陳毅翰）

10 月至翌年 5 月普遍之冬候鳥，在東北部與金門則終年可見。爲大型且體型肥胖之雁鴨，身體主要爲暗褐色，具有白色眉線與黑色過眼線，而黑色的喙其先端爲黃色，腳爲橘紅色。通常小群於海岸或附近之大型水域中活動，喜歡水生植物豐富之棲地。

灰面鵟 （攝影者：黃文欣）

普遍的春(3 至 5 月)秋(10 月)過境鳥與稀有之冬候鳥。眼睛與虹膜爲黃色，灰褐色頭部有著較爲灰色的臉頰，具有白色眉線，喉部有一黑色縱線，胸部與腹部密布許多橫斑。主要出現於低中海拔山區，秋季過境期時在墾丁滿洲、春季過境時於八卦山都是相當適合觀察的地點；常乘著上升氣流集結成龍捲風狀往上盤旋。

紅隼 （攝影者：黃文欣）

普遍之冬候鳥。爲翼形尖長的小型猛禽，背部爲紅褐色雜有許多黑色斑點，淡黃褐色的腹部則有許多黑褐色縱斑，尾羽末端有一明顯黑帶；雄鳥的頭尾爲灰色。可出現於海邊、濕地、河川、平原、低海拔山區空曠地與高山草原；常見其於空中定點振翅尋找獵物。



燕鴴 （攝影者：池文傑）

爲不普遍之夏候鳥，通常於4月下旬抵達。具有粗短的黑色喙，飛行時翼長且曲度大，可見清晰之分叉短尾以及白腰；繁殖期時，紅色的嘴基、黑色眼先自眼下延伸於胸前繞成一環，同時體上褐色，搭配著胸前的暖黃棕色，十分有夏天的氣息。北部多於過境時才可見，通常出現於中部以南與東部之河川河床、廣闊旱地與農耕地。

高蹺鴴 （攝影者：陳毅翰）

局部性普遍之冬候鳥，春秋過境時亦常見。細長的黑色尖嘴，與全身黑色與白色強烈對比，再配上一雙粉紅色又長的雙腳，那就是牠。臺灣北部的的數量並不多，多集中於南部近海鹽田、沼澤度冬，亦見於河口、池塘與近海水田；於臺灣南部地區已有穩定的繁殖紀錄。

小環頸鴴 （攝影者：陳毅翰）

大部分是8月至翌年4月普遍之冬候鳥，於臺灣亦有繁殖。爲具有黃色眼環的小型涉禽，其頸部的黑色環帶完整，背爲棕褐色，有一雙黃色的腳；繁殖季時，額前與嘴基到耳羽部位有黑色橫帶。常單種小群出現於水田、沼澤或乾涸魚塭中，亦會棲息於多石之河床。

東方環頸鴴 （攝影者：陳毅翰）

10 月至翌年 4 月普遍之冬候鳥，亦有不少的留鳥族群。爲小型的灰棕色涉禽，頸後有白圈，胸前環帶不相連，腳丫爲灰黑色，飛行時可見白色翼帶；雄鳥於繁殖季時，頭頂轉爲栗紅色。常大群於潮間帶灘地、河口、鹽田棲息，於淡水流域較少出現。

金斑鴴 （攝影者：池文傑）

9月至翌年5月普遍之冬候鳥或春秋過境鳥，亦有滯留度夏的群體。爲一身上密佈金黃色斑點的涉禽；繁殖季時，體下則轉爲均勻之黑色，十分顯眼漂亮且易於辨認。於海岸、河口、鹽田、沼澤及近海之草地、農耕地與牧場均可見其蹤跡。

小辮鴴 （攝影者：黃文欣）

11月至翌年2月不普遍之冬候鳥。體上爲帶有金屬光澤之墨綠色，黑色的胸前與白色腹部，配上一雙暗紅色的腳丫，再加上有如辮子般的頭部細長冠毛，十分易於辨識。通常呈小群出現於近海之水田、濕地、廢耕地或短草地。

濱鷸 （攝影者：黃文欣）

10月至翌年3月普遍之冬候鳥。具有長而緩緩下彎的喙，體上爲單調的灰棕色，頸部有細縱紋，體下爲白色；繁殖季時，體上出現栗紅褐色，腹部則有明顯的黑色大斑塊，故又稱黑腹濱鷸。大群出現於潮間與海濱沼澤，常不斷用嘴於泥中戳食底棲生物；受到驚擾時，常大群於空中翻飛。

青足鷸 （攝影者：黃文欣）

8月至翌年4月普遍之冬候鳥，部分地方終年可見。爲大型鷸鳥，稍厚、微翹的長喙及灰綠色或黃綠色的長腳，是最大的特徵，飛行時可見明顯倒V字形白腰。通常小群活動於潮間帶、近海之沼澤與稻田，過境時偶可見上百隻的群體。



鷹斑鷸 （攝影者：池文傑）

8月至翌年4月不普遍之冬候鳥，於9月及翌年3、4月過境期間大量出現。身形較爲纖細高挑，具有白色眉線，而體上褐棕色帶有大量淡色斑點，同時有著一雙細長的黃色腳丫。通常大群在淺水之草澤、水田中棲息，行動時常會明顯上下擺動尾部。

尖尾鷸 （攝影者：黃文欣）

普遍之春季過境鳥，秋季亦可見。中小型的亮棕褐色鷸鳥，頭頂明顯偏栗紅色，腳爲黃綠色；繁殖期時，頭頂栗紅色更爲顯著且有黑色細縱紋，體上羽爲黑褐色，羽緣爲灰褐或紅褐色，箭頭狀斑點自胸前延伸至腹側。通常成群出現於潮間帶與近海之沼澤、鹽田及水田。

翻石鷸 （攝影者：陳毅翰）

多於4月份春季過境時出現，秋季過境期亦有，中、南部及金門則有度冬族群。矮胖型的涉禽，具有短尖而微翹的黑色喙，全身爲栗紅色、黑色與白色的鮮明對比；而飛行時可見明顯翼帶及白色腰部。喜成群於潮間帶灘地、河口及濱海之沼澤中出現，亦可見於礁岩環境。

黑腹燕鷗 （攝影者：陳毅翰）

爲普遍的過境鳥，尤其是春季過境時數量龐大，於西南海岸則爲普遍之冬候鳥。全身主要是污白色，黑褐色寬帶自眼後向後延伸至後頭部，尾呈魚尾狀；繁殖季時，胸腹則轉爲黑棕色。常出現於近海的池塘、魚塭及沼澤；常自空中衝入水中捕食小魚。

小燕鷗 （攝影者：陳昭旺）

主要是 3 月至 10 月普遍之夏候鳥，但是亦有度冬族群。喙較其他小型燕鷗細長，尾羽具有明顯分叉；繁殖季時，先端黑色的黃色喙、黑色過眼線與黑色的頭頂與後頸、橘黃色的腳丫是明顯的特徵。通常出現在河口、沙岸、魚塭環境；常於空中原地鼓翅尋找食物。

筒鳥 （攝影者：黃文欣）

4 至 10 月普遍之夏候鳥。眼紅褐色且有黃色眼圈，全身大致是鼠灰色，白色的腹面有許多黑色橫斑。出現於低至高海拔的山區；不自行築巢與育雛，將卵托放於其他鳥種巢中。



家燕 （攝影者：池文傑）

普遍之夏候鳥，2月下旬即可見，8月即行南遷。額與喉部爲栗紅色，體上藍黑色，上胸有暗色環帶，具有明顯的尾部分叉與雪白的腹部。於都會區普遍易見，以泥土混雜草莖作巢，常築於住家騎樓角落牆上，爲貼壁之碗狀巢，經常停棲於巢附近的電線上。

黃鶺鴒 （攝影者：黃文欣）

8月至翌年4月普遍之冬候鳥與過境鳥，8月即可見大量過境。喙與腳爲黑色，具有淡色眉線，體上爲橄欖褐色，體下則爲污白色，尾羽兩側有明顯白色；行進時會上下擺動尾部，飛行時呈波浪狀前進。多呈小群出現於平原之開闊濕地；遷移過境時則可見於任何海拔。

赤喉鷚 （攝影者：黃文欣）

10月至翌年4月普遍之冬候鳥。非繁殖季時，臉爲淡棕色或污黃色，體上棕褐色且有對比明顯之黑色粗縱紋，胸前及體側有許多暗色縱紋；繁殖季時，頭部與喉部轉爲栗紅色，體下爲暖棕色。獨自或小群出現於平原濕地或大面積短草地。



紅尾伯勞 （攝影者：陳毅翰）

9月至翌年4月普遍之冬候鳥，於9月南遷時常隨處可見。牠們的背面大體爲褐色，其如猛禽般的勾狀喙以及粗黑的過眼線，就是最大特點。通常出現在平原農耕地、空曠地或低海拔森林邊緣，遷移過境時亦可見於中高海拔；常停棲於突出物上。

黃尾鴝 （攝影者：陳毅翰）

10月至翌年3月不普遍之冬候鳥。雄鳥有著銀灰色的頭、黑色的臉與背、橙褐色的胸腹以及顯眼的白色翼斑；雌鳥全身大致爲黃褐色，翼爲暗褐色，白色翼斑則較雄鳥小。主要出現於海濱防風林與農耕地、平地至中海拔之空曠樹林或開闊地；常見其停棲於突出物上，並不斷擺動尾羽。



藍磯鶇 （攝影者：黃文欣）

主要是9月至翌年4月普遍之冬候鳥，但是幾乎終年可見。雄鳥頭、胸與背大致爲深藍色，腹部則爲栗紅色；雌鳥全身以褐色爲主體，腹面顏色較淡且有許多麟狀斑紋。多獨自出現在平地到中海拔的空曠地帶，常停棲於屋頂、木樁或其他突出物上。



虎鶇 （攝影者：陳毅翰）

主要是不普遍之過境鳥，亦是稀有之留鳥。黃褐色的背上密佈著黑色麟狀斑紋，腹中央至尾下覆羽爲白色。自平地至高海拔的樹林或農耕地帶都可發現其蹤跡，常單獨在濃密的樹林底層活動。



赤腹鶇 （攝影者：陳毅翰）

11 月至翌年 3 月普遍之冬候鳥，過境時數量較多。具有淡黃色眼圈，全身大致爲橄褐色或灰褐色，胸與脇則爲橙紅色。多於平地至中海拔之樹林地帶的地面活動，亦會棲息於農耕地。



極北柳鶯 （攝影者：黃文欣）

普遍之過境鳥。背面大致爲橄欖綠色，有著黃白色的眉斑及一條不明顯的翼帶，腹面則爲黃白色。通常於平地至低海拔的樹林上層單獨活動，性活潑好動。

灰斑鶲 （攝影者：黃文欣）

不普遍之春秋過境鳥。有著暗灰褐色的背部及臉部、夾雜許多黑色縱斑的白色腹面，具有明顯白色翼帶。多出現在海岸附近之樹林地帶，平地至低海拔樹林地帶亦有；具有捕食後飛回原處之習性。

黑臉鵐 （攝影者：黃文欣）

10 月至翌年 4 月普遍之冬候鳥。背面大致爲棕褐色，其上有許多黑色縱斑；雄鳥的眼先與嘴基部爲黑褐色，雌鳥則有明顯淺色眉斑與黑色顎線。通常棲息於濱海的樹林、草灌叢、農耕地帶，平地至中海拔的草叢、灌木叢與樹林中亦會出現。

花雀 （攝影者：黃文欣）

不普遍之春秋過境鳥。全身爲橙色、褐色、黑色與白色的強烈對比，飛行時可見明顯白色腰部。濱海、平地至山區的樹林、草原、農耕地是牠們較常出現的環境，通常呈小群集體活動，過境時偶可見大群集結。



灰椋鳥 （攝影者：池文傑）

不普遍之春秋過境鳥，但是亦有度冬族群。橙色喙部先端黑色，白色的額與臉夾雜有黑色羽毛，全身大致爲黑褐色至褐色，飛行時可見明顯白色腰部；雄鳥頭部顏色較爲暗黑。常單獨或呈小群出現於濱海及平地與低海拔之樹林、空曠地帶、農耕地。

藍尾鴝 （攝影者：陳毅翰）

10 月至翌年 4 月不普遍之冬候鳥，秋季過境時數量較多。雄鳥具有灰藍色的臉部與背面、白色眉斑以及橙黃色的胸側與脇；雌鳥則有淡色眼環與橄褐色背部。主要出現在中、低海拔與海岸附近之空曠樹林邊緣；停棲時常擺動尾羽。